

PRODUCCIÓN PORCINA Y DEFORESTACIÓN EN QUINTANA ROO


SIMBOLOGÍA

- Límite municipal
- Zona urbana
- Producción porcina baja
- Producción porcina media
- Producción porcina alta

PRINCIPALES CAMBIOS DE COBERTURA DE SUELO

- AGRICULTURA
- PASTIZAL-GANADERÍA
- USO URBANO

DEFORESTACIÓN Y TIPOS DE CAMBIO EN MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PORCÍCOLA



- La actividad porcícola en Quintana Roo es un importante impulsor de la deforestación y sus daños colaterales pueden afectar la salud de la población. La mayor producción de ganado porcino se da en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, los cuales al 2018 aportaron más de 1,000 toneladas de cabezas de ganado en pie en ese año.

- Quintana Roo es parte de una de las regiones más vulnerables a la contaminación del agua subterránea, de la cual se abastece casi toda su población. Esto, debido al
- suelo permeable y que las aguas subterráneas se encuentran a poca profundidad y, segundo, al escaso o nulo tratamiento de las aguas residuales generadas por la industria porcícola y su inadecuada disposición final.

MUNICIPIOS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE GANADO PORCINO *

