TASA DE DEFORESTACIÓN BRUTA EN CHIAPAS

¿QUE ES LA DEFORESTACIÓN?

Es la pérdida permanente de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales. Implica el cambio de uso de tierra forestal a cualquier otro uso de la tierra, tales como el uso agrícola, praderas, asentamientos humanos, humedales u otras tierras.

El estado de Chiapas, de 2001 a 2018, se han perdido 320,809 hectáreas , lo equivalente a:


17,823 ha/año de tierras forestales deforestadas


LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA PÉRDIDA DE TIERRAS FORESTALES EN CHIAPAS EN EL PERIODO 2001 A 2018 SON:

- **72%** Cambio de selvas a praderas 231,260 ha
- **23%** Cambio de selvas a Tierra agrícola 75,337 ha
- **3%** Cambio de selvas a asentamientos humanos 10,452 ha
- **1%** Cambio de selvas a otras tierras 3,760 ha

ECORREGIONES EN MÉXICO

- California Mediterránea
- Desiertos de América del Norte
- Elevaciones Semiáridas Meridionales
- Grandes Planicies
- **Selvas Cálido-Húmedas**
- **Selvas Cálido-Secas**
- **Sierras Templadas**





¿QUÉ SON LAS ECORREGIONES?

Son unidades geográficas homogéneas con rasgos fisiográficos, climáticos y de vegetación que tienen especies de flora y fauna característicos de las mismas.


ECORREGIONES EN MÉXICO

México tiene 7 ecorregiones continentales de nivel 1, las cuales integran diversos ecosistemas forestales.

ECORREGIONES EN CHIAPAS


De las 7 ecorregiones terrestres en México, el estado de Chiapas se ubica entre las ecorregiones “Selvas Cálido- Húmedas”, “Selvas Cálido- Secas” y Sierras Templadas.

PORCENTAJE DE DEFORESTACIÓN POR TIPO DE ECORREGIÓN



- Selvas Cálido-Húmedas
- Sierras Templadas
- Selvas Cálido-Secas


DEFORESTACIÓN BRUTA ANUAL PROMEDIO POR TIPO DE TRANSICIÓN (2001-2018)



- Cambio de selvas a praderas FL - GL
- Cambio de selvas a Tierra agrícola FL - CL
- Cambio de selvas a asentamientos humanos FL - SL
- Cambio de selvas a otras tierras FL - OL

COMPORTAMIENTO DE LA DEFORESTACIÓN BRUTA EN CHIAPAS (PROMEDIOS TRIANUALES)

Por primera vez, las estimaciones de la deforestación incluyen una evaluación de la incertidumbre, representada por los intervalos de confianza.




https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf

La estimación de deforestación bruta en el estado de Chiapas consistió en la evaluación de 6,529 parcelas de muestreo, de las cuales, 381 presentaron deforestación en el periodo 2001-2018.

PRINCIPALES ZONAS CRÍTICAS DE DEFORESTACIÓN


En Chiapas, se observa una dinámica media y baja de deforestación en toda la entidad. No obstante, la zona con mayor incidencia de deforestación, se dio en los municipios de Marqués de Comillas, así como en Benemérito de las Américas.



INCIDENCIA DE DEFORESTACIÓN

- Baja
- Media baja
- Media alta
- Alta

Para más información ingresa a:



USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA · KFW · GCF task force · pro natura sur · dataMares www.datamares.org

DISEÑO: KualiComunicación

MEDIO AMBIENTE SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | CONAFOR COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

gob.mx/conafor